


为了安全地进行新冠疫苗接种，
打了新冠疫苗后产生不良反应时，

切记下列注意事项



切记下列注意事项打了新冠疫苗后， 按照下列方法做的话，对本人会有所帮助。



本人打针部位有浮肿、痛症时，
用干净的毛巾盖上后用冰袋冷敷。



如有微热时，应该充分地喝水，
好好休息。



如果本人因发热、肌肉痛而不舒服时，
服用解热片或止痛剂后会好转。

* 打新冠疫苗之前，准备好有乙胺苯酚(acetaminophen)成分的解热片或镇痛剂，
在打了新冠疫苗后如有伤风症状时，就服用解热片或止痛剂。

如果有下列情况时， 请立即去医院接受医生诊断。

接种后

- 打了新冠疫苗后，打针部位浮肿、痛症、发作在48小时后继续恶化时；
- 打了新冠疫苗后，在四个星期内出现呼吸困难、胸痛、持续腹痛、腿部浮肿时；
- 打了新冠疫苗后，连续两天头痛，服了镇痛剂也没效果，或视野模糊时；
- 打了新冠疫苗后，突然感到没力气或出现与平时不同的症状时；
- 打了新冠疫苗后，不是打针部位，而在其他部位出现淤青或出血时；



如果有下列情况时， 打电话给119， 或直接去急诊室。

- 打了新冠疫苗后，感到呼吸困难，或严重头晕时；
- 打了新冠疫苗后，嘴唇和脸肿起来，
或全身出现风疹块时；
- 打了新冠疫苗后，忽然失去知觉或摔倒时；

